

Idealprofil des südwestdeutschen Braunjura

Das hier dargestellte Idealprofil kommt nirgends so vollständig vor. Es gibt regionale, lokale und kleinräumige Profilunterschiede mit Schichtlücken, Aufarbeitungs-horizonten und Durch/Vermischungen der einzelnen Zonen, Subzonen und Horizonte.

Formation/Stufe Zone Subzone Horizont

Ornatenton-Form. Sengenthal-Form. Kandern-Form. Unter-Oxfordium <u>Dogger zeta</u>			
Ornatenton-Form. Sengenthal-Form. Kandern-Form. Ober-Callovium <u>Dogger zeta</u>	Cordatum		
	Mariae		
Ornatenton-Form. Sengenthal-Form. Kandern-Form. Ober-Callovium <u>Dogger zeta</u>	Lamberti	Lamberti	lamberti
			distractum
		Henrici	flexispinatum
			entospina
	Athleta	Spinosum	megaloglobulus
			punctulatum
			prosoinuatum
		Proniae	fraasi
			quenevexa
			complanatoides
		Phaenium	trifidum
			berckhemeri
	Coronatum	Grossouvrei	
		Obductum	
	Jason	Jason	jason beta
			jason alpha
		Medea	medea beta
			medea alpha
	Calloviense	Enodatum	incisium
			enodatum beta
enodatum alpha			
Calloviense		calloviense	
Ornatenton-Form. Sengenthal-Form. Kandern-Form. Mittel-Callovium <u>Dogger zeta</u>	Koenigi	Galilaeii	copernici
			galilaeii
		Curtilobus	subcostarius
	Gowerianus		macrocephalus
			megalocephalus beta
			megalocephalus alpha
			toricellii

Ornatenton-Form. Unter-Callovium <u>Dogger zeta</u>	Herveyi	Kamptus	kamptus beta	
			kamptus alpha	
		Terebratus	terebratus beta	
			terebratus alpha	
			wutachense	
			suevicum beta	
			suevicum alpha	
		Keppleri	quenstedtiforme	
			kepleri II	
			kepleri I	
Ornatenton-Form. Sengenthal-Form. Ober-Bathonium <u>Dogger epsilon</u>	Discus		radiatus	
			hochstetteri	
	Orbis	Hannoveranus	retrocostatum	
			hannoveranus	
		Blanazense	orbis	
				tenuistriatus
Variansmergel-Form. Oolithkalk-Form. Sengenthal-Form. Ober-Bathonium <u>Dogger epsilon</u>	Hodsoni			
	Morrisi		schwandorfense	
	Subcontractus		modiolaris	
			rugifer	
	Progracilis		suspensum	
	Variansmergel-Form. Dentalienton-Form. Unter-Bathonium <u>Dogger epsilon</u>	Zigzag	Tenuiplictus	secundus
Yeovilensis			bradleyi	
Macrescens			gyrumbilicum	
Convergens			extinctus	
Hamitenton-Form. Hauptrogenstein-Form. Ober-Bajocium <u>Dogger delta</u>	Parkinsoni	Bomfordi	aspidoides	
		Truellei	friedericiaugusti	
			rarecostata	
			subarietis beta	
		Acris	subarietis alpha	
		Garantiana	Tetragona	tetragona
				wetzeli
	Garantiana		subgaranti	
			suevica	
	Baculata	Dichotoma		
			schroederi	
			bonarelli	
			prosicostata	
			orbigny	
			sauzeanum	
			cylindricum	
			haugi	
	inferior			
	bifurcus			
	phaulus			

Ostreenkalk-Form. Ober-Bajocium <u>Dogger delta</u>	Niortense	Polygyralis	polygyralis	
			debilis	
			phaulus	
		Banksii	diniensis	
	Humphriesianum	Blagdeni		coronatum
				acuticostatum
		Humphriesianum		crassicosta
				gibbosum
				umbilicum
				mutabile
		Romani		gervillii/cycloides
				edouardiana
				romani
		Pinguis		cf. complanata
	deltafalcata			
	frechi			
Sauzei			pinguis	
			carinodiscus	
			macrum	
			pseudocontrahens	
			quenstedti	
Wedelsandstein-Form. Unter-Bajocium <u>Dogger gamma</u>	Laeviuscula	Laeviuscula	glauca	
				spinifera
		Trigonalis		trigonalis
				pseudoromanoides
				stephani
				adicra beta
			adicra alpha	
		macer		
	Ovale			oechslei
				ovale
	Discites			
Eisensandstein/ Achdorf-Form. Ober-Aalenium <u>Dogger beta</u>	Concavum	Formosum		
		Concavum	cavatum	
	Bradfordensis		decipiformis	
		Gigantea	falcifera	
		Bradfordensis	geisingensis	
	Murchisonae		gigantea	
			staufensis	
			discoidea beta	
			discoidea alpha	
			latiumbilicus	
Haugi		sinon		
		opalinoides		
		subfalcatum		

Opalinuston-Form. Unter-Aalenium <u>Dogger alpha</u>	Opalinum	Bifidatum	viallii
			evolutum
			crassicostatum
			unicinatum
			bifidatum/rieberi
		Opalinum	hansrieberi
			opaliniforme
			dilucidum
			opalinum
			torulosum/opalinum