

Idealprofil des südwestdeutschen Braunjura

Das hier dargestellte Idealprofil kommt nirgends so vollständig vor. Es gibt regionale, lokale und kleinräumige Profilunterschiede mit Schichtlücken, Aufarbeitungs-horizonten und Durch/Vermischungen der einzelnen Zonen, Subzonen und Horizonte.

Formation/Stufe Zone Subzone Horizont

Ornatenton-Form. Sengenthal-Form. Kandern-Form. Unter-Oxfordium <u>Dogger zeta</u>				
	Cordatum			
	Mariae			
Ornatenton-Form. Sengenthal-Form. Kandern-Form. Ober-Callovium <u>Dogger zeta</u>		Lamberti	lamberti	
			distractum	
		Lamberti	Henrici	flexispinatum
	entospina			
	Athleta	Spinosum	megaloglobulus	
			punctulatum	
			prosoinuatum	
		Proniae	fraasi	
			quenevexa	
			complanatoides	
			trifidum	
	Coronatum	Phaenium	berckhemeri	
		Grossouvrei		
	Jason	Jason	Obductum	
jason beta				
Medea		jason alpha		
		medea beta		
		medea alpha		
Ornatenton-Form. Sengenthal-Form. Kandern-Form. Mittel-Callovium <u>Dogger zeta</u>	Calloviense	Enodatum	incisium	
			enodatum beta	
		enodatum alpha		
		Calloviense	calloviense	
Koenigi	Gowerianus	Galilaeii	copernici	
			galilaeii	
	Gowerianus	Curtilobus	subcostarius	
			macrocephalus	
		Gowerianus	Gowerianus	megalocephalus beta
				megalocephalus alpha
		toricellii		

Ornatenton-Form. Unter-Callovium <u>Dogger zeta</u>	Herveyi	Kamptus	kamptus beta
			kamptus alpha
		Terebratus	terebratus beta
			terebratus alpha
			wutachense
			suevicum beta
			suevicum alpha
		Keppleri	quenstedtiforme
			kepleri II
			kepleri I
Ornatenton-Form. Sengenthal-Form. Ober-Bathonium <u>Dogger epsilon</u>	Discus		radiatus
			hochstetteri
	Orbis	Hannoveranus	retrocostatum
			hannoveranus
		Blanazense	orbis
Variansmergel-Form. Oolithkalk-Form. Sengenthal-Form. Ober-Bathonium <u>Dogger epsilon</u>	Hodsoni		
	Morrisi		schwandorfense
	Subcontractus		modiolaris
			rugifer
	Progracilis		suspensum
	Variansmergel-Form. Dentalienton-Form. Unter-Bathonium <u>Dogger epsilon</u>	Zigzag	Tenuiplictus
Yeovilensis			bradleyi
Macrescens			gyrumbilicum
Convergens			extinctus
Hamitenton-Form. Hauptrogenstein-Form. Ober-Bajocium <u>Dogger delta</u>	Parkinsoni	Bomfordi	aspidoides
		Truellei	friedericiaugusti
			rarecostata
			subarietis beta
		Acris	subarietis alpha
		Garantiana	Tetragona
			wetzeli
	Garantiana		subgaranti
			suevica
	Baculata	Dichotoma	
			schroederi
			bonarelli
			prosicostata
			orbigny
			sauzeanum
			cylindricum
		haugi	
	inferior		
	bifurcus		
	phaulus		

Ostreenkalk-Form. Ober-Bajocium <u>Dogger delta</u>	Niortense	Polygyralis	polygyralis		
			debilis		
			aplous		
		Banksii	diniensis		
	Humphriesianum	Blagdeni		coronatum	
				acuticostatum	
		Humphriesianum		crassicostatum	
				umbilicum	
				mutabile	
				gervillii/cycloides	
		Romani		edouardiana	
				romani	
				cf. complanata	
		Humphriesianum	Pinguis		deltafalcata
					frechi
				pinguis	
Ostreenkalk-Form. Gosheim-Form. Unter-Bajocium <u>Dogger delta</u>	Sauzei		carinodiscus		
			macrum		
			pseudocontrahens		
			quenstedti		
			dilatus		
Wedelsandstein-Form. Unter-Bajocium <u>Dogger gamma</u>	Laeviuscula	Laeviuscula	glauca		
				spinifera	
		Trigonalis		trigonalis	
				pseudoromanoides	
				stephani	
				adicra beta	
		adicra alpha			
		macer			
	Ovale			oechslei	
				ovale	
Discites					
Eisensandstein/ Achdorf-Form. Ober-Aalenium <u>Dogger beta</u>	Concavum	Formosum			
		Concavum	cavatum		
	Bradfordensis		decipiformis		
			falcifera		
		Gigantea	geisingensis		
		Bradfordensis	gigantea		
	Murchisonae	Murchisonae		staufensis	
				discoidea beta	
		discoidea alpha			
		latiumbilicus			
		sinon			
Haugi		opalinoides			
		subfalcatum			
		viallii			

Opalinuston-Form. Unter-Aalenium <u>Dogger alpha</u>	Opalinum	Bifidatum	evolutum	
			crassicostatum	
			unicinatum	
		Opalinum		bifidatum/rieberi
				hansrieberi
				opaliniforme
				dilucidum
				opalinum
				torulosum/opalinum

Profil: Rolf Roth